

## МАТЕМАТИКА

1. Если число  $a + 1$  делится без остатка на 3, то на какое из приведенных чисел делится без остатка число  $4 + 7a$  ( $a \in N$ )?  
 А) 3    В) 7    С) 5    D) 11

**Решение.** Если число  $a + 1$  делится без остатка на 3, то его можно записать в виде:  $a + 1 = 3n$  ( $n \in N$ ). Тогда  $4 + 7a = (4 + 4a) + 3a = 4(1 + a) + 3a = 4(3n) + 3a = 3(4n + a)$ , ( $n \in N$ ). Значит число  $4 + 7a$  тоже делится на 3 без остатка.

**Правильный ответ: 3**

**Источник:** Математика 6 класс  
 М.Мирзаахмедов и др. "O'qituvchi" 2017

2. Сравните числа:  $a = \frac{7}{105}$ ,  $b = \frac{7}{103}$ ,  
 $c = \frac{7}{104}$ .

А)  $a < c < b$     В)  $c < a < b$     С)  $a < b < c$   
 D)  $b < c < a$

**Решение.** Среди дробей с одинаковыми числителями больше (меньше) будет та, у которой знаменатель меньше (больше).

Значит верным будет  $a < c < b$ .

**Правильный ответ:  $a < c < b$**

**Источник:** Математика 6 класс  
 М.Мирзаахмедов и др. "O'qituvchi" 2017

3. Найдите тринадцатую цифру после запятой в записи числа  $\frac{2}{33}$  в виде бесконечной периодической десятичной дроби.

А) 0    В) 6    С) 2    D) 3

**Решение.** Обыкновенную дробь  $\frac{2}{33}$  можно привести к дроби со знаменателем 99, умножив и числитель, и знаменатель на 3, а дробь со знаменателем 99 легко представить в виде бесконечной периодической десятичной дроби.

$$\frac{2}{33} = \frac{2 \cdot 3}{33 \cdot 3} = \frac{6}{99} = 0, (06) = 0, 06060606 \dots$$

В дроби  $\frac{2}{33} = 0, 06060606 \dots$  на всех чётных местах после запятой стоит цифра 6, а на всех нечётных местах после запятой стоит цифра 0. Так как 13 нечётное число, значит тринадцатая цифра после запятой будет 0.

**Правильный ответ: 0**

**Источник:** Математика 6 класс  
 М.Мирзаахмедов и др. "O'qituvchi" 2017

4. На автомобиле нужно проехать 1090 km. В первый день проехали 60 % пути. Сколько километров нужно ещё проехать?


А) 436    В) 437    С) 438    D) 439

**Решение.** После того как на автомобиле проехали 60 % от 1090 km остаётся проехать ещё 40 % пути. Найдём 40 % от 1090 km:  $1090 \times 40/100 = 436$ . Значит автомобилю нужно проехать ещё 436 km.

**Правильный ответ: 436**

**Источник:** Математика 6 класс  
 М.Мирзаахмедов и др. "O'qituvchi" 2017

5. Три точки заданы координатами  $A(x)$ ,  $B(x^2)$ ,  $C(\sqrt{x})$ , где  $0 < x < 1$ . Какой из данных рисунков соответствует этим точкам?



**Решение.** Квадрат числа, принадлежащего промежутку  $0 < x < 1$ , меньше самого числа, а квадратный корень из этого числа больше самого числа:

$$0 < x < 1 \Rightarrow 0 < x^2 < x < 1,$$

$$0 < x < 1 \Rightarrow 0 < x < \sqrt{x} < 1.$$

Значит верным будет


$$0 < x^2 < x < \sqrt{x} < 1.$$

**Правильный ответ:**



**Источник:** Алгебра 8 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

6. Анвар плывёт на лодке в стоячей воде с постоянной скоростью 3 км/ч. По суше Анвар движется с постоянной скоростью 5 км/ч. По данным рисунка определите за какое самое короткое время (минут) Анвар доберётся от его текущего положения до дома.



- A) 154 B) 170 C) 152 D) 156

**Решение.** По условию задачи скорость лодки  $v_q = 3$  км/ч, скорость движения Анвара по суше  $v_a = 5$  км/ч, а скорость течения  $v_0 = 0$  км/ч. Пусть самое короткое время займёт путь по траектории вдоль отрезков  $OP$  и  $PB$ . Обозначим  $PB = x$  км (здесь  $0 \leq x \leq 7,5$ ), тогда  $AP = 7,5 - x$  км. Получаем:

$$OP = \sqrt{OA^2 + AP^2} = \sqrt{4^2 + (7,5 - x)^2}$$

Значит время – это функция, зависящая от  $x$ :

$$t = \frac{\sqrt{4^2 + (7,5 - x)^2}}{3} + \frac{x}{5}$$

Наименьшее значение этой функции найдём с помощью производной:

$$\begin{aligned} t' &= \frac{\left(\sqrt{4^2 + (7,5 - x)^2}\right)'}{3} + \left(\frac{x}{5}\right)' = \\ &= \frac{x - 7,5}{3\sqrt{4^2 + (7,5 - x)^2}} + \frac{1}{5} = 0 \end{aligned}$$

Решив полученное уравнение, получаем  $x = 4,5$ .

Значит наименьшее время, за которое Анвар доберётся до дома, равно

$$t = \frac{\sqrt{4^2 + 3^2}}{3} + \frac{4,5}{5} = \frac{5}{3} + \frac{9}{10} = \frac{77}{30} \text{ часа}$$

или 154 минуты.

**Правильный ответ: 154**

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 11 класс М.Мирзаахмедов и др. "Zamin nashr" 2018

7. Вычислите:

$$\sqrt{6 - 4\sqrt{2}} + \sqrt{7 + 2\sqrt{10}} + 2 - \sqrt[4]{(-5)^2}$$

A) 4 B) 0 C) -3 D) 5

**Решение.** Выражение

$$\sqrt{6 - 4\sqrt{2}} + \sqrt{7 + 2\sqrt{10}} + 2 - \sqrt[4]{(-5)^2}$$

разделим для удобства на 3 части

$$\sqrt{6 - 4\sqrt{2}}; \sqrt{7 + 2\sqrt{10}}; \sqrt[4]{(-5)^2}$$

и упростим каждую из них:

$$1) \sqrt{6 - 4\sqrt{2}} = \sqrt{4 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}} + 2 =$$

$$= \sqrt{2^2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2} =$$

$$= \sqrt{(2 - \sqrt{2})^2} = |2 - \sqrt{2}|, \text{ так как}$$

$2 > \sqrt{2} > 0$  получаем

$$\sqrt{6 - 4\sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}.$$

$$2) \sqrt{7 + 2\sqrt{10}} = \sqrt{5 + 2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{2} + 2} =$$

$$= \sqrt{(\sqrt{5})^2 + 2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2} =$$

$$= \sqrt{(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

Получаем, что  $\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$ .

$$3) \sqrt[4]{(-5)^2} = \sqrt[4]{5^2} = \sqrt{5}$$

Получаем, что  $\sqrt[4]{(-5)^2} = \sqrt{5}$ .

Подставляем полученные данные в исходное выражение

$$\sqrt{6 - 4\sqrt{2}} + \sqrt{7 + 2\sqrt{10}} + 2 - \sqrt[4]{(-5)^2}$$

упрощаем его:

$$\sqrt{6 - 4\sqrt{2}} + \sqrt{7 + 2\sqrt{10}} + 2 - \sqrt[4]{(-5)^2} =$$

$$= 2 - \sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{2} + 2 - \sqrt{5} = 2 + 2 = 4$$

**Правильный ответ: 4**

**Источник:** Алгебра 8 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

8. Какое из ниже перечисленных чисел не является членом арифметической прогрессии 4; 7; 10; 13; ...?

A) 32 B) 31 C) 37 D) 49

**Решение.** Члены арифметической прогрессии 4; 7; 10; 13; ... запишем в виде:

$$3 + 1; 6 + 1; 9 + 1; 12 + 1; \dots$$

Значит общий член этой прогрессии

$$a_n = 3n + 1 \text{ (где } n \in N)$$

Исходя из записи можно сделать вывод что все члены данной арифметической прогрессии состоят из натуральных чисел, которые при делении на 3 дают в остатке 1.

По этому признаку из приведенных чисел не подходит только число 32, так как оно при делении на 3 даёт в остатке 2.

**Правильный ответ: 32**

**Источник:** Алгебра 9 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019.

9. Упростите выражение  $\frac{x^2 - 4}{4x^2} \cdot \frac{2x}{x + 2}$  и найдите его значение при  $x = 4$ .

A) 0,25 B) 0,05 C) 0,02 D) 0,01

**Решение.** Прежде чем подставлять значение  $x$  упростим выражение:

$$\frac{x^2 - 4}{4x^2} \cdot \frac{2x}{x + 2} = \frac{(x - 2)(\cancel{x + 2})}{\cancel{2}4x^{\cancel{2}}} \cdot \frac{\cancel{2}x}{\cancel{x + 2}} =$$

$$= \frac{x - 2}{2x}$$

В упрощенное выражение  $\frac{x - 2}{2x}$

подставим значение  $x = 4$  и получим:

$$\frac{x - 2}{2x} = \frac{4 - 2}{2 \cdot 4} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0,25$$

**Правильный ответ: 0,25**

**Источник:** Алгебра 8 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

10. Сократить дробь  $\frac{15x^2 - x - 28}{3x + 4}$

- A)  $5x - 7$     B)  $5x + 7$     C)  $x + 7$   
 D)  $x - 7$

**Решение.** Разложим числитель дроби  $\frac{15x^2 - x - 28}{3x + 4}$  на множители и сократим


получившуюся дробь:

$$\frac{(5x - 7)(3x + 4)}{3x + 4} = 5x - 7$$

**Правильный ответ:**  $5x - 7$

**Источник:** Алгебра 8 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

11. Какое из приведённых неравенств верно для угла  $\alpha$ , изображённого на рисунке?



- A)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha < 0$     B)  $\operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \alpha > 0$   
 C)  $\operatorname{ctg} \alpha \cdot \cos \alpha < 0$     D)  $\operatorname{ctg} \alpha \cdot \sin \alpha > 0$

**Решение.** На рисунке видно, что луч, построенный под углом  $\alpha$  относительно положительного направления оси  $x$ , лежит во II четверти. Тогда верны неравенства  $\sin \alpha > 0$ ,  $\cos \alpha < 0$ ,  $\operatorname{tg} \alpha < 0$  и  $\operatorname{ctg} \alpha < 0$ . По этому, среди приведённых неравенств, верным является только  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha < 0$ .

**Правильный ответ:**  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha < 0$

**Источник:** Алгебра 9 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

12. Решите уравнение:  $\frac{5}{\sin^2 x} + \frac{7}{\sin x} - 6 = 0$

A)  $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$

B)  $(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$

C)  $(-1)^k \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in Z$

D)  $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in Z$

**Решение.** Данное уравнение преобразуем к виду:

$$6\sin^2 x - 7\sin x - 5 = 0 \quad (\sin x \neq 0).$$

Сделаем замену  $\sin x = t$ , и получим квадратное уравнение

$$6t^2 - 7t - 5 = 0.$$

Корни этого уравнения  $t_1 = \frac{5}{3}$  и  $t_2 = -\frac{1}{2}$ .

Отсюда получаем уравнения  $\sin x = \frac{5}{3}$  и

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

Уравнение  $\sin x = \frac{5}{3}$  решений не имеет.

Уравнение  $\sin x = -\frac{1}{2}$  имеет корни

$$x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z.$$

Значит решением уравнения будет

$$x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z.$$

**Правильный ответ:**

$$(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z$$

**Источник:** Алгебра 9 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

13. В уравнении  $5 + 5^{2x+y} - 5^{x+1} - 5^{x+y} = 0$ , выразить  $x$  через  $y$ , если  $x \neq 0$ .

- A)  $x = 1 - y$     B)  $x = -1 - y$   
 C)  $x = y - 1$     D)  $x = y + 1$

**Решение.** Разложим левую часть уравнения  $5 + 5^{2x+y} - 5^{x+1} - 5^{x+y} = 0$  (где  $x \neq 0$ ) на множители:

$$\begin{aligned} 5 + \underline{5^{2x} \cdot 5^y} - \underline{5 \cdot 5^x} - \underline{5^x \cdot 5^y} &= 0 \\ 5(1 - 5^x) - 5^x \cdot 5^y(1 - 5^x) &= 0 \\ (5 - 5^x \cdot 5^y) \cdot (1 - 5^x) &= 0 \end{aligned}$$

Чтобы произведение было равно нулю, один из множителей должен быть равен нулю. Рассмотрим оба варианта:

$$1 - 5^x = 0 \text{ или } 5 - 5^x \cdot 5^y = 0$$

1) решив уравнение  $1 - 5^x = 0$  получаем

$$5^x = 1 \Rightarrow 5^x = 5^0 \Rightarrow x = 0, \text{ что}$$

противоречит условию задачи  $x \neq 0$ .

2) решив уравнение  $5 - 5^x \cdot 5^y = 0$

получаем

$$5^{x+y} = 5 \Rightarrow 5^{x+y} = 5^1 \Rightarrow x + y = 1 \Rightarrow$$

$$x = 1 - y$$

Ответ  $x = 1 - y$  не противоречит условию, значит является верным.

**Правильный ответ:**  $x = 1 - y$

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 10 класс М.Мирзаахмедов и др. "Extremum press" 2017

14. Решите уравнение:  $x^{\frac{\log_5 \log_5 x}{\log_5 x}} = \log_5 14$

- A) 14    B) 5    C) 25    D) 7

**Решение.** Сначала найдём область определения:

$$\begin{cases} \log_5 x > 0 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Rightarrow x > 1$$

Для решения уравнения  $x^{\frac{\log_5 \log_5 x}{\log_5 x}} = \log_5 14$  (где  $x > 0$ ,  $x \neq 1$ ) применим к левой

части уравнения формулы  $\frac{\log_c b}{\log_c a} = \log_a b$  и

$$a^{\log_a b} = b:$$

$$x^{\frac{\log_5 \log_5 x}{\log_5 x}} = \log_5 14$$

$$x^{\log_x \log_5 x} = \log_5 14$$

$$\log_5 x = \log_5 14$$

Уравнение  $\log_5 x = \log_5 14$  решается с помощью свойства логарифма:

$$\log_a b = \log_a c \Rightarrow b = c$$

По данному свойству получаем, что  $x = 14$ .

**Правильный ответ:** 14

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 10 класс М.Мирзаахмедов и др. "Extremum press" 2017

15. Найти значение  $x_0 + 2$ , где  $x_0$  является натуральным корнем уравнения  $(x^2 + x) + (x^2 + 2x) + \dots + (x^2 + 19x) = 1425$   
 А) 7    В) 10    С) 8    D) 6

**Решение.** В выражении  $(x^2 + x) + (x^2 + 2x) + \dots + (x^2 + 19x) = 1425$  раскроем скобки и приведем к виду:

$$x^2 + x + x^2 + 2x + \dots + x^2 + 19x = 1425$$

Упростим полученное выражение, приведя подобные члены:

$$\underline{x^2} + \underline{x} + \underline{x^2} + \underline{2x} + \dots + \underline{x^2} + \underline{19x} = 1425$$

$$19x^2 + \underline{x + 2x + \dots + 19x} - 1425 = 0$$

$$19x^2 + (1 + 2 + \dots + 19)x - 1425 = 0$$

Сумму  $1 + 2 + \dots + 19$  вычислим с помощью формулы:

$$1 + 2 + \dots + N = \frac{N \cdot (N + 1)}{2}$$

$$1 + 2 + \dots + 19 = \frac{19 \cdot (19 + 1)}{2} =$$

$$= \frac{19 \cdot 20}{2} = 190$$

Получаем квадратное уравнение

$$19x^2 + 190x - 1425 = 0, \text{ все}$$

коэффициенты которого для удобства

делим на 19 и получим уравнение:

$$x^2 + 10x - 75 = 0$$

По теореме Виета уравнение вида

$$ax^2 + bx + c = 0, (a \neq 0) \text{ решается с}$$

помощью системы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \text{ где } x_1 \text{ и } x_2 \text{ корни}$$

уравнения.

Применив теорему Виета к уравнению

$$x^2 + 10x - 75 = 0, \text{ получаем корни}$$

уравнения  $x_1 = -15$  и  $x_2 = 5$ .

Число  $-15$  не является натуральным,

значит единственным натуральным

корнем уравнения

$$(x^2 + x) + (x^2 + 2x) + \dots + (x^2 + 19x) = 1425$$

будет  $x_0 = 5$ .

Тогда  $x_0 + 2 = 7$

**Правильный ответ: 7**

**Источник:** Алгебра 9 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

16. Если пара чисел  $(x; y)$  является решением системы уравнений  $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 56 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases}$ , то найти значение  $x - \sqrt{xy} + y$ .

А) 5    В) 6    С) 7    D) 8

**Решение.** Для нахождения значения выражения  $x - \sqrt{xy} + y$  разложим первое уравнение системы на множители

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 56 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2xy + y^2 - xy = 56 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x + y)^2 - xy = 56 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x + y)^2 - (\sqrt{xy})^2 = 56 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x + \sqrt{xy} + y) \cdot (x - \sqrt{xy} + y) = 56 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases}$$

Подставим вместо первого множителя его значение из второго уравнения и упростим:

$$\begin{cases} 8 \cdot (x - \sqrt{xy} + y) = 56 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \sqrt{xy} + y = 7 \\ x + \sqrt{xy} + y = 8 \end{cases}$$

Получаем  $x - \sqrt{xy} + y = 7$

**Правильный ответ: 7**

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 10 класс М.Мирзаахмедов и др. "Extremum press" 2017

17. Решить неравенство  $\left| \frac{5}{2x-6} \right| > \frac{7}{9}$

A)  $(-\infty; -\frac{3}{14}) \cup (6\frac{3}{14}; +\infty)$

B)  $(-\frac{3}{14}; 6\frac{3}{14})$

C)  $(-\frac{3}{14}; 3) \cup (3; 6\frac{3}{14})$

D)  $(-\frac{3}{14}; 0) \cup (0; 6\frac{3}{14})$

**Решение.**

$$\left| \frac{5}{2x-6} \right| > \frac{7}{9} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{2x-6}{5} \right| < \frac{9}{7} \\ 2x-6 \neq 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\frac{9}{7} < \frac{2x-6}{5} < \frac{9}{7} \\ x \neq 3 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\frac{45}{7} < 2x-6 < \frac{45}{7} \\ x \neq 3 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\frac{3}{7} < 2x < \frac{87}{7} \\ x \neq 3 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\frac{3}{14} < x < \frac{87}{14} \\ x \neq 3 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in \left(-\frac{3}{14}; 3\right) \cup \left(3; 6\frac{3}{14}\right)$$

**Правильный ответ:**

$$x \in \left(-\frac{3}{14}; 3\right) \cup \left(3; 6\frac{3}{14}\right)$$

**Источник:** Алгебра 8 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

18. Если  $f(x) = (x-2) \cdot g(x)$ , а  $g(x) = 2x^2$ , то найдите функцию  $f(x)$ .

A)  $f(x) = 2x^3 - 4x^2$     B)  $f(x) = x^3 - x^2$

C)  $f(x) = 2x^3 + 4x^2$

D)  $f(x) = -2x^3 - 4x^2$

**Решение.** В функцию

$f(x) = (x-2)g(x)$  подставим значение функции  $g(x)=2x^2$  и упростим:

$$f(x) = (x-2)g(x) = (x-2) \cdot 2x^2 = 2x^3 - 4x^2.$$

Значит  $f(x) = 2x^3 - 4x^2$ .

**Правильный ответ:**  $f(x) = 2x^3 - 4x^2$

**Источник:** Алгебра 8 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

19. Чему равно  $b$ , если число  $\sqrt{5}$  является нулем функции  $y = -2x^2 + bx - 15$ ?

A)  $5\sqrt{5}$     B) 1    C)  $5\sqrt{2}$     D)  $5\sqrt{3}$

**Решение.** По условию  $\sqrt{5}$  является нулем функции, значит  $y(\sqrt{5}) = 0$ .

Подставим значение в функцию и найдём значение  $b$ :

$$0 = -2(\sqrt{5})^2 + b \cdot \sqrt{5} - 15, \text{ отсюда } b = 5\sqrt{5}.$$

**Правильный ответ:**  $5\sqrt{5}$

**Источник:** Алгебра 9 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

20. Найдите производную функции

$$f(x) = 7x^3 + \sin(5x)$$

A)  $21x^2 + 5 \cos(5x)$

B)  $21x^2 - 5 \cos(5x)$

C)  $7x^2 - 5 \cos(5x)$

D)  $\frac{7x^2}{3} + \frac{\cos(5x)}{5}$

**Решение.** Для нахождения производной функции  $f(x) = 7x^3 + \sin(5x)$  нам понадобятся: правило нахождения производной от суммы функций, формула нахождения производной от степенной функции  $(ax^n)' = nax^{n-1}$  и формула нахождения производной от тригонометрической функции  $(\sin kx)' = k \cos kx$ . Применим правила и найдём производную:

$$f'(x) = (7x^3 + \sin(5x))' = 3 \cdot 7x^2 + 5 \cdot \cos(5x) = 21x^2 + 5 \cos(5x)$$

**Правильный ответ:**  $21x^2 + 5 \cos(5x)$

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 11 класс М.Мирзаахмедов и др. "Zamin nashr" 2018

21. Найдите наименьшее значение функции

$$y = x + \frac{25}{x-5} \text{ на промежутке } (5; \infty).$$

A) 15 B) 14 C) 16 D) 13

**Решение.** Пусть функция  $f(x)$  определена и имеет производную на промежутке  $(5; +\infty)$ .

Найдём производную функции

$$f'(x) = \left(x + \frac{25}{x-5}\right)' = 1 - \frac{25}{(x-5)^2}.$$

Приравняем к нулю производную и найдём стационарные точки:

$$f'(x) = 1 - \frac{25}{(x-5)^2} = 0$$

$$(x-5)^2 = 25$$

Отсюда  $x_1 = 0$  и  $x_2 = 10$ . Точка  $x_1 = 0$  не принадлежит рассматриваемому промежутку  $(5; +\infty)$ . Точка  $x_0 = 10$  является локальным минимумом, так как на промежутке  $(5; 10]$  функция убывает, а на промежутке  $[10; +\infty)$  возрастает. Найдём значение функции в точке  $x_0 = 10$ :

$$f(10) = 10 + \frac{25}{10-5} = 15.$$

**Правильный ответ: 15**


**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 11 класс М.Мирзаахмедов и др. "Zamin nashr" 2018

22. Вычислите площадь фигуры, ограниченной заданными линиями:

$$y = \sqrt{x}, y = \sqrt{3-2x}, y = 0$$

A) 1 B) 0 C) 1,5 D) 2,5

**Решение.** Необходимо найти площадь криволинейной трапеции. Сначала найдём точки пересечения функций. Для этого приравняем функции и решим получившееся уравнение  $\sqrt{x} = \sqrt{3-2x}$ . Получаем что функции пересекаются в точке  $x_0 = 1$ .



Разделим фигуру на 2 части, с площадями  $S_1$  и  $S_2$ , как показано на рисунке. Площадь всей фигуры найдём путём сложения площадей её составляющих  $S = S_1 + S_2$ . Площадь

первой части  $S_1 = \int_0^{x_0} \sqrt{x} dx$  и площадь

второй части  $S_2 = \int_{x_0}^{\frac{3}{2}} \sqrt{3-2x} dx$


$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \sqrt{x} dx + \int_1^{\frac{3}{2}} \sqrt{3-2x} dx = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \Big|_0^1 - \frac{1}{3} \sqrt{(3-2x)^3} \Big|_1^{\frac{3}{2}} = \\ &= \frac{2}{3} (\sqrt{1^3} - \sqrt{0^3}) - \\ &\quad - \frac{1}{3} \left( \sqrt{\left(3-2 \cdot \frac{3}{2}\right)^3} - \sqrt{(3-2 \cdot 1)^3} \right) = 1 \end{aligned}$$

**Правильный ответ: 1**

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 11 класс М.Мирзаахмедов и др. "Zamin nashr" 2018



23. По данным рисунка вычислите площадь равнобокой трапеции  $ABCD$ .



- A) 28    B) 11    C) 24    D) 21


**Решение.** Площадь равнобокой трапеции  $ABCD$ , изображённой на рисунке равна  $S = \frac{AB + DC}{2} \cdot DH$ . Так как трапеция равнобокая, то верно равенство  $\frac{AB + DC}{2} = HB$ . Значит  $\frac{AB + DC}{2} = 7$  и  $DH = 4$ .

Тогда  $S = \frac{AB + DC}{2} \cdot DH = 7 \cdot 4 = 28$ .

**Правильный ответ: 28**

**Источник:** Геометрия 8 класс  
А.Рахимкариев "Yangiyo'l poligraf servis"  
2019

24. По данным рисунка определите длину окружности.



- A)  $10\pi$     B)  $12\pi$     C)  $9\pi$     D)  $11,2\pi$

**Решение.** Так как  $AB$  является касательной к окружности, то  $OA \perp AB$ . Значит треугольник  $OAB$  равнобедренный ( $\angle OAB = 90^\circ$ ).

$OA = OC = r$ , по теореме Пифагора  $r^2 + 12^2 = (r + 8)^2$ .

Отсюда  $r = 5$ , а длина окружности  $L = 2\pi r = 10\pi$ .

Значит длина окружности  $L = 10\pi$ .

**Правильный ответ:  $10\pi$**

**Источник:** Геометрия 8 класс  
А.Рахимкариев "Yangiyo'l poligraf servis"  
2019

25.  $ABCD$  - ромб, если  $AC > BD$  и

$$\frac{AC}{BD} - \frac{BD}{AC} = 2. \text{ Найти } \angle A.$$

- A)  $45^\circ$     B)  $30^\circ$     C)  $\arctg 2$     D)  $2\arctg 2$

**Решение.** Обозначим диагонали ромба  $d_1$  и  $d_2$  ( $d_1 = AC$ ,  $d_2 = BD$ ), стороны ромба  $a$  и углы ромба  $\angle A = \alpha$ ,  $\angle B = 180^\circ - \alpha$ .

Упростим данные из условия:

$$\frac{AC}{BD} - \frac{BD}{AC} = 2 \Leftrightarrow \frac{AC^2 - BD^2}{AC \cdot BD} = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{d_1^2 - d_2^2}{d_1 \cdot d_2} = 2 \Leftrightarrow d_1^2 - d_2^2 = 2d_1 \cdot d_2$$

Применим формулу площади ромба

$$S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = a^2 \sin \alpha \text{ и получим уравнение}$$

$$d_1 \cdot d_2 = 2a^2 \sin \alpha. \text{ Так как}$$

$\cos(180 - \alpha) = -\cos \alpha$ , то по теореме косинусов найдём значение диагоналей ромба и получим систему уравнений:

$$\begin{cases} d_1^2 = 2a^2 + 2a^2 \cos \alpha \\ d_2^2 = 2a^2 - 2a^2 \cos \alpha \end{cases}$$

Вычтем из первого уравнения системы второе и получим:

$$d_1^2 - d_2^2 = 4a^2 \cos \alpha.$$

Обобщив ранее полученные результаты, получаем:

$$\begin{cases} d_1^2 - d_2^2 = 4a^2 \cos \alpha \\ d_1^2 - d_2^2 = 2d_1 \cdot d_2 = 4a^2 \sin \alpha \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 \cos \alpha = 4a^2 \sin \alpha$$

$$\cos \alpha = \sin \alpha$$

$$\operatorname{tg} \alpha = 1$$

Так как  $AC > BD$ , то  $\alpha$  - острый угол, значит:

$$\alpha = 45^\circ$$


**Правильный ответ:  $45^\circ$**

**Источник:** Геометрия 8 класс  
А.Рахимкариев "Yangiyo'l poligraf servis"  
2019

26. Из точки вне плоскости опущены две наклонные с длинами соответственно  $12$ ;  $6\sqrt{2}$  и перпендикуляр. Найти длину перпендикуляра, если наименьший из углов при основаниях наклонных равен  $30^\circ$ .

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

**Решение.**



На рисунке показаны точка  $A$ , не лежащая на плоскости, две наклонные  $AC$  и  $AB$ , перпендикуляр  $AD$ . По условию  $AC > AB$ , значит угол  $C$  равен  $30^\circ$ , как меньший при основании наклонных. Рассмотрим  $\triangle ACD$ , в нём  $AC = 12$ ,  $\angle C = 30^\circ$  и  $\angle ADC$  прямой, так как  $AD$  перпендикуляр. По определению синуса и зная, что  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ , получаем, что:

$$\sin \angle C = \frac{AD}{AC} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{AD}{12} \Leftrightarrow AD = 6$$

**Правильный ответ: 6**


**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 10 класс

М.Мирзаахмедов и др. "Extremum press" 2017

27. Из точки, находящейся на расстоянии 2 от плоскости, проведены две наклонные к плоскости под углом  $30^\circ$ . Угол между проекциями этих наклонных  $120^\circ$ . Найти расстояние между основаниями наклонных.

A) 6 B) 4 C) 2 D) 8

**Решение.**



На рисунке изображена точка  $B$ , не лежащая на плоскости, две наклонные  $BA$  и  $BE$  и перпендикуляр к плоскости  $BC$ . Прямоугольные треугольники  $ABC$  и  $BCE$  равны. В них  $\angle A = \angle E = 30^\circ$ , значит используя определение тангенса, можем найти стороны  $AC = EC$ :

$$\operatorname{tg} \angle A = \frac{BC}{AC} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{AC} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow AC = EC = 2\sqrt{3}$$

В  $\triangle ACE$   $\angle C = 120^\circ$ . Применим для него теорему косинусов и найдём расстояние между основаниями наклонных  $AE$ :

$$AE^2 = AC^2 + EC^2 - 2AC \cdot EC \cdot \cos 120^\circ$$

$$AE^2 = 12 + 12 - 2 \cdot 12 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$AE = 6$$

**Правильный ответ: 6**


**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 10 класс

М.Мирзаахмедов и др. "Extremum press" 2017

28. Найдите координаты точки, полученной при повороте на  $180^\circ$  точки  $(3; 4)$  вокруг начала координат.

- A)  $(-3; -4)$     B)  $(-3; 4)$     C)  $(3; -4)$   
 D)  $(-4; 3)$

**Решение.**



Точка с координатами  $(3; 4)$ , изображённая на рисунке, перемещаясь по окружности вокруг начала координат на угол  $180^\circ$ , переходит в точку симметричную ей относительно точки  $(0; 0)$ . При этой симметрии её координаты переходят в  $(-3; -4)$ .

**Правильный ответ:**  $(-3; -4)$

**Источник:** Алгебра 9 класс Ш.Алимов и др. "O'qituvchi" 2019

29. Если в множестве  $A$  содержится 3 элемента, в множестве  $B$  содержится 4 элемента, то каково минимально возможное количество подмножеств множества  $A \cup B$ ?

- A) 16    B) 32    C) 8    D) 128

**Решение.** Если в множестве  $A$  содержится 3 элемента, а в множестве  $B$  4 элемента, то наименьшее возможное количество элементов в множестве  $A \cup B$  (где  $A \subset B$ )  $n=4$ .

Значит наименьшее возможное количество подмножеств множества  $A \cup B$ :

$$2^n = 2^4 = 16.$$


**Правильный ответ: 16**

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 11 класс М.Мирзаахмедов и др. "Zamin nashr" 2018

30. На плоскости проведены 3 прямые. На какое наибольшее число частей делят эти прямые данную плоскость?

- A) 7    B) 6    C) 3    D) 4

**Решение.**



Как показано на рисунке, 3 прямые могут разделить плоскость максимум на 7 частей.

**Правильный ответ: 7**

**Источник:** Математика (алгебра и основы математического анализа, геометрия) I-II часть 11 класс М.Мирзаахмедов и др. "Zamin nashr" 2018